




ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้ออกประกาศให้ “แมว” เป็นสัตว์ควบคุมพิเศษ ที่กำหนดให้ผู้เลี้ยงต้องพามาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า นั้น ทั้งนี้เพื่อการลดข้อสงสัย และข้อกังวลเกี่ยวกับการเกิดโรค ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า “แมว” เป็น 1 ในสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อก่อโรคพิษสุนัขบ้า อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามักได้ยินว่าโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่เกิดจากสุนัขเป็นหลัก ส่วนที่เกิดจากแมวจริง ๆ พบว่ามีประมาณร้อยละ 2 ของผู้ป่วยที่เจอทั้งหมด

ซึ่งอันที่จริงโดย ลักษณะของแมวแล้วนั้นจะมีฟัน มีเขี้ยวที่ค่อนข้างเล็ก และแหลมคม เมื่อถูกกัดแผลจะค่อนข้างลึก รูเล็ก แต่เมื่อถอนคมเขี้ยวแผลจะมีลักษณะปิด ทำให้คนมองว่าแมวกัด



สัตว์เลี้ยงแสนรัก แฝงภัยร้ายถึงตาย



เป็นเรื่องเล็ก ๆ จนไม่ได้จัดการสกัคน้ำเหลืองเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้า

“หากแมวที่กัดเรานั้นมีเชื้อพิษสุนัขบ้าจริง ๆ พอแผลลึกถึงชั้น

กล้ามเนื้อคนเรา ซึ่งเป็นชั้นที่เชื้อสามารถแบ่งตัวได้เร็ว การรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวไม่พอ จำเป็นต้องได้รับสารสกัดจากน้ำเหลืองด้วยเพื่อทำลายเชื้อให้ได้มากที่สุด”

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามักมีคนรักแมวก็พาไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอยู่แล้ว ซึ่งไม่ทราบว่ามีสัดส่วนเท่าไร

แต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะสื่อสาร คือ เมื่อถูกแมวกัดควรรีบฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และรีบถึงกระบวนการจัดการสกัคน้ำเหลืองด้วย

เพื่อร่วมกันขจัดโรคพิษสุนัขบ้าจากประเทศไทย เนื่องจากในช่วงปีหลัง ๆ มานี้พบว่ามีคนเสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น จากที่เคยควบคุมสถานการณ์จนมี คนเสียชีวิตต่ำกว่า 10 รายมานานหลายปี และล่าสุดปีนี้มี การยืนยันป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว 5 ราย.

อภิวรรณ เสาเวียง