

หญิง62เข้ารพ. กินไก่ป่วยอหิวาต์

กรณีพบไก่พื้นบ้านและไก่ชนล้มตายในหลายจังหวัด โดยเฉพาะที่จ.สุโขทัย มีไก่ตายไปแล้วหลายอำเภอนับพันตัว ต่อมาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ออกสำรวจสาเหตุมาจากไก่ติดเชื้ออหิวาต์ เปิดไก่อะบาศก่อนลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจในการป้องกันโรค ล่าสุด พบชาวบ้านล้มป่วยหลังสัมผัสซากไก่และนำไก่ป่วยไปทำอาหาร โดยเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวไปที่โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย หลังทราบว่ามีชาวบ้านกินไก่ตายแล้วมีอาการป่วยมารักษา ทราบชื่อนางจำลอง ทัพแก้ว อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66/3 หมู่ 13 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชชนาลัย

นางจำลองเปิดเผยว่า ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ไก่ของตนทยอยล้มตายจำนวนมากเหมือนกับชาวบ้านรายอื่น จึงนำซากไปฝังและไม่ได้สวมถุงมือ คิดว่าจับซากไก่คงไม่เป็นไร และด้วยความเสียสละเลยนำไก่ที่มีอาการป่วย 3-4 ตัว มาเชือดทำอาหาร 1 ตัว ที่เหลือแช่ตู้เย็นเก็บไว้ กระทั่งเย็นวันที่ 21 มิ.ย. เริ่มมีอาการเจ็บคอ ไอและมีไข้สูง หนาวสั่น เข้าวันที่ 23 มิ.ย. จึงไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่ง แพทย์ฉีดยาให้ 1 เข็ม แต่อาการไม่ดีขึ้น เลยตัดสินใจไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์แยกมาพักอยู่ในห้องแยกโรคเป็นการเฉพาะ เพื่อรอผลตรวจสาเหตุ

นายเอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่ากรณีไก่ล้มตายหลายจังหวัด รวมถึงพื้นที่อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท พบไก่ชนตายกว่า 50 ตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ขณะนี้ได้นำซากส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บเพื่อยืนยันการตายที่แท้จริง ส่วนสาเหตุอาจมาจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องบวกกับอากาศร้อนบ้าง ชื้นบ้าง ทำให้สัตว์เครียด ไม่สบายและใช้ขึ้นสูงล้มตายไปทีละตัว อย่างไรก็ตาม ที่จ.ชัยนาท ยังไม่พบโรคอหิวาต์เปิดไก่อะบาศอย่างใด

“โดยทั่วไปโรคอหิวาต์มีอยู่ 4 โรคที่มีวัณขึ้นป้องกันโรค คือ 1.โรคนิวคาสเซิล 2.โรคอหิวาต์เปิดไก่อ 3.โรคฝีดาษ และ 4.โรคหลอดลมอักเสบ โรคดังกล่าวเป็นโรคที่ไม่ติดต่อดูดกิน เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำให้โรคเหล่านี้ไม่สามารถติดต่อหรือแพร่ระบาดมาสู่ตัวคนได้ส่วนการฆ่าและเปิดไก่อที่ป่วยและตายด้วยโรคดังกล่าวเศษเนื้อเลือดและน้ำล้างทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาดได้เช่นกัน ที่สำคัญห้ามกินสัตว์ปีกล้มตายแบบผิดปกติ เพราะยังไม่รู้แน่ชัดว่าเชื้อที่ทำให้สัตว์ตายคือเชื้ออะไร จึงไม่แนะนำให้กิน” ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทกล่าวและว่าหากพบไก่ตายไม่ทราบสาเหตุต้องรีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอ หากไก่ตายเยอะต้องรีบกำจัดด้วยการฝังหรือเผาทันที และต้องเก็บตัวอย่างไว้ตรวจสอบตามมาตรการเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายของกรมปศุสัตว์